

Topologie : Quelques précisions.

Jean-Baptiste Campesato

8 septembre 2009

Pour plus
d'informations
(définitions et
explications des
définitions) sur
l'intersection et la
réunion voir
I Théorie des ensembles
(E, II, p22/23) de N.
BOURBAKI

Il s'agit de préciser la note en marge du document sur la caractérisation des topologies par leurs voisinages.

En effet on définit souvent une *structure topologique* (ou *topologie*) comme un ensemble \mathcal{O} de parties d'un ensemble E vérifiant :

- $\emptyset \in \mathcal{O}$ et $E \in \mathcal{O}$.
- Toute réunion d'ensembles de \mathcal{O} appartient aussi à \mathcal{O} .
- Toute intersection *finie* d'ensembles de \mathcal{O} appartient à \mathcal{O} .

Cependant seuls les deux derniers points sont nécessaires, en effet ils impliquent le premier, c'est que nous allons éclaircir ici.

D'après la définition si on se donne $(X_i)_{i \in I}$ une famille de \mathcal{O} avec I fini alors $\bigcup_{i \in I} X_i \in \mathcal{O}$ et

$$\bigcap_{i \in I} X_i \in \mathcal{O}.$$

Rappelons que $\bigcup_{i \in I} X_i = \{x \mid (\exists i)(i \in I \text{ et } x \in X_i)\}$

et que $\bigcap_{i \in I} X_i = \{x \mid x \in E \text{ et } (\forall i)((i \in I) \Rightarrow (x \in X_i))\}$ (la condition $x \in E$ permet d'avoir une relation collectivisante lorsque $I = \emptyset$).

Ainsi, si $I = \emptyset$ la relation $(\exists i)(i \in I \text{ et } x \in X_i)$ est toujours fautive et donc $\bigcup_{i \in I} X_i = \emptyset$ et donc

$\emptyset \in \mathcal{O}$. Et toujours si $I = \emptyset$ la relation $(\forall i)((i \in I) \Rightarrow (x \in X_i))$ est toujours vraie et donc

$\bigcap_{i \in I} X_i = E$ et donc $E \in \mathcal{O}$.

On a donc retrouvé le premier point à partir des deux derniers.

Montrons cependant une autre subtilité :

Toute intersection *finie* d'ensembles de \mathcal{O} appartient à $\mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{cases} \forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}, O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O} \\ E \in \mathcal{O} \end{cases}$.

Il ne faut pas oublier le second point dans cette équivalence, en effet :

\Rightarrow : le premier point est immédiat, le second a été montré ci dessus.

\Leftarrow : tout le problème réside dans le fait qu'il ne faut pas oublier de traiter du cas de l'intersection vide.

Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille de \mathcal{O} avec I fini.

• Si $I = \emptyset$ alors $\bigcap_{i \in I} X_i = E \in \mathcal{O}$ d'après la seconde hypothèse.

• Sinon si $I \neq \emptyset$ on montre par récurrence sur $n = \text{card}(I)$ que $\bigcap_{i \in I} X_i \in \mathcal{O}$ grâce à la première hypothèse. ■

Il faut retenir que pour montrer le troisième point de la définition d'une topologie il faut et il suffit de vérifier $\begin{cases} \forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}, O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O} \\ E \in \mathcal{O} \end{cases}$.

Si l'hypothèse $\emptyset \in \mathcal{O}$ et $E \in \mathcal{O}$ est rajoutée dans les cours c'est donc pour penser à traiter ce point (prendre en compte le cas particulier $I = \emptyset$), bien que ce soit inutile si les deux derniers points sont traités rigoureusement.